Die Anwendung von Arzneimitteln wie Dobendan Direkt Zuckenfrei Flurbiprofen, ist möglicherweise mit einem geringfügig erhöhten Risiko für Herzanfälle (Herznifarkt) oder Schlaganfälle verbunden. Jades Risiko ist wahrscheinlicher mit hohen Dosen und länger dauemder Behandlur Überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosis oder Behandlungsdauer (siehe Abschnitt 3).

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Dobendan Direkt Zuckerfrei Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten
Flurbiprofen 8,75 mg

Flurbiprofen 8,75 mg

mte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Wenden Sie dieses Auzuren inwer immer genachten Sie diese später nochmals lesen. Apothekers an. Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Heben Sie die Packungsbeilage auf weitere Informationen oder einen Rat benötigen. Fragen Sie Ihren Apotheker. Dies gilt auch für Wenn Sie Nebenwirkungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4. Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4. Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Wenn 'Sie sich mach' 3' flagen in dict besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Azt.

1986 aufstungsbilgebeinhalte:

1. Was ist Doberdab Direkt Zuckerfer Flutprofeen und wofür wird es angewender?

2. Was schlens Ser der Awwendung von Doberdan Direkt Zuckerfer Flutprofeen beachten?

3. Wie ist Doberdab Direkt Zuckerfer Flutprofeen anzubewehren?

4. Weich Nebenwirkungen sind mindbild.

5. Was sollens Ser der Awwendung von Doberdan Direkt Zuckerfer Flutprofeen beachten?

6. Was ist Doberdan Direkt Zuckerfer Flutprofeen aufzubewahren?

7. Was sollens Ser der Awwendung von Borbardan Direkt Zuckerfer Flutprofeen beachten?

8. Was sollens Direkt Zuckerfer Flutprofeen aufzubewahren Eigenschaften.

8. Doberdan Direkt Zuckerfer Flutprofeen aufzubewahren Eigenschaften.

9. Doberdan Direkt Zuckerfer Flutprofeen und sehn zuchen Schledzeschwerden angewender.

9. Was sollens Diekt Zuckerfer Flutprofeen auf der Symptome nach 3' agen schlechter werden oder sich nicht bessenn.

2. Was sollens Ser vor der Awwendung von Doberdan Direkt Zuckerfer Flutprofeen beschren.

3. Was sollens Ser vor der Awwendung von Doberdan Direkt Zuckerfer Flutprofeen beschren Bestandteile Gesess Ammer der Symptome nach 3' agen schlechter werden, weren Sich mit Dessenn.

2. Was sollens Ser vor der Arwendung von Doberdan Direkt Zuckerferie Flutprofeen beschren Flutprofen der Symptome nach 3' agen schlechter Werden, weren Sich an einen Azit werden Ser schler Flutprofen Leonomenthol der einen der in Abschrige gestandteile Gesess Ammer Sich seinen Ser von Azitum usw.) anwenden, wenn Sie nicht betrammen von Nachren Flutprofen, Leonomenthol der einen der in Abschrige gegen geschwirten, Demgeschwirten Demgeschwirten Berenzbraden, Berenzbraden, wenn Sie nach der Einer Werten Symptome Leonomenthol der einem anderen Näch Asthma, unewahre Perfalten werden Warnen Berenzbraden, der Einer Werten Vorsichter Berenzbraden geschlicher beren Schleiber werden Sich Weiter einer Schleiber ander einer Schleiber vor Sie Doberdan Direkt Zuckerfer Flutprofen e

Name argumented to the Kinder unter 12 altern angwender weden.

Amending von Doberdan Direkt Zuckerfer Hindprofen mit andren Arzueimitet in formiere 18 bes Azueimitet sille nicht bei Kinder unter 12 altern angwender weden.

Amending von Doberdan Direkt Zuckerfer Hindprofen mit andren Arzueimitet in formiere 18 bes 18 best 20 bes 20 best 20 bes We ist Dobendan Direkt Zuckerfrei Flurbiprofen anzuwenden?
 Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben an oder wie verordnet. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

3193766

Empfohlene Dosierung: Für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren:

• Nehmen Sie i Lutschabelte und lassen Sie diese langsam im Mund zergehen.

• Bewegen Sie die Lutschabelte und lassen Sie diese langsam im Mund.

• Die Lutschabelte sollte innerhalb von 30 Minuten zu wirken beginnen.

• Die Lutschabelte sollte innerhalb von 30 Minuten zu wirken beginnen.

• Die Lutschabelte sollte innerhalb von 30 Minuten zu wirken beginnen.

• Die Lutschabelte sollte innerhalb von 30 Minuten zu wirken beginnen.

• Wenden Sie die Lutschabelten zu wirken beginnen.

• Wenden Sie nicht mehr als 5 Lutschabelten innerhalb von 24 Stunden an.

• Wenden Sie nicht mehr als 5 Lutschabelten innerhalb von 24 Stunden an.

• Wenden Sie möglichst wenige Lutschlabelten innerhalb von 24 Stunden an.

• Wenden Sie probendan Direkt Zuckerfier Flurbiprofen abgebrochen werden.

• Wenden Sie Dobendan Direkt Zuckerfier Flurbiprofen nicht länger als 3 Tage an, es sei denn, Ihr Arzt hat es Ihren verordnet. Falls Sie sich nicht besser oder sogar sschlechter fühlen, oder falls nie be Beschwerden auftreten, sprechen Sie mit Ihren Arzt oder Apotheker.

• Wenn Sie eine größere Menge von Dobendan Direkt Zuckerfier Flurbiprofen angewendet haben, als Sie sollten:

• Sprechen Sie mit Ihren Arzt oder Apotheker.

• Wenn Sie die Anwendung von Dobendan Direkt Zuckerfier Flurbiprofen angewendet haben, als Sie sollten:

• Sprechen Sie mit Ihren Arzt oder Apotheker.

• Wenn Sie die Anwendung von Dobendan Direkt Zuckerfier Flurbiprofen angewendet haben, köpfschmerzen und Magen-Dam-Blutungen sind ebenfalls möglich:

• Was Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittels raben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

• Was Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittels und suchen Sie unverzüglich ärztliche Hilfe auf, wenn eine dieser Nebenwirkungen bei Die stellen und Arzneimittels und suchen Sie unverzüglich ärztliche Hilfe auf, wenn eine dieser Nebenwirkungen bei Die stellen und Arzneimittels und Arzneimittels und Arzneimittels und Arzneimitels und Arzneimitels und Arzneimitels und A

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Dobendan Direkt Zuckerfrei Flurbiprofen enthält:

Der Wirkstoff ist Flurbiprofen 8,75 mg.

Die sonstigen Bestandteile sind: Macrogol 300, Kallumhydroxid (E525), Orangen-Aroma, Levomenthol, Acesulfam-Kali (E965) und Isomaltitol (E933).

Wie Dobendan Direkt Zuckerfrei Flurbiprofen aussieht und Inhalt der Packung

Die Lutschtabletten sind runde, weiße bis blassgelbe Tabletten mit einer Prägung auf beiden Seiten.

Dobendan Direkt Zuckerfrei Flurbiprofen ist in Blisterpackungen zu 8, 16 und 24 Stück erhältlich. Es werden möglicherv Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer

n: Hersteller

De Ni Borden in 10 Gebes der 10 mehr 1

Anzeichen einer allergischen Reaktion, wie Asthma, unerwartet erschwertes Ein- und/oder Ausatmen, Kurzatmigkeit, Juckreiz, laufende Nase oder Hautausschläge.

Schwellungen im Gesicht, der Zunge oder im Rachen, die Atembeschwerden verursachen, Herzrasen, Blutdruckabfall bis hin zum Schock (diese können auch bei der ersten Anwendung des Arzneimittels auftreten).

Schwere Hautreaktionen wie Schälen der Haut, Blæsenbildung oder schuppende Haut.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie eine der folgenden Nebenwirkungen oder Nebenwirkungen, die nicht gelistet sind, bemerken:

Häufig (kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen)

Schwindel, Kopfschmerzen

Reizung im Rachenaum

Geschwüre oder Schmerzen im Mund

Hässchmerzen im Mund

Schlaringkeit
Schlaringkeit
Blasenbildung im Mund oder Rachenraum, Taubheftsgefühl im Rachen
Geblähter Magen, Bauchschmerzen, Flatulerz, Verstopfung, Verdauungsstörungen, Übelkeit.
Trockener Mund
Brennen im Mund, veränderter Geschmackssinn
Hautausschläge, juckende Haut
Fleber, Schmerzen
Müdigkeit oder Schwierigkeiten beim Einschlafen
Verschlimmenung von Asthma, Pfeifalmung, Kurzalmigkeit
Vermindertes Empfinden im Rachenraum
Ilten (kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen)
anaphylaktische Reaktionen

Julierzen jenehmes oder untypisches Gefühl im Mundbereich (Wärme, Brennen, Kribbeln) sit und Durchfall sin und Juckreiz der Haut entlich (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen) rokeit

Hersteller
RB NL Brands B.V. Schiphol Blwd 207, 1118 BH Schiphol, Niederlande
RB NL Brands B.V. Schiphol Blwd 207, 1118 BH Schiphol, Niederlande
RB NL Brands B.V. Schiphol Blwd 207, 1118 BH Schiphol, Niederlande
RB NL Brands B.V. Schiphol Blwd 207, 1118 BH Schiphol, Niederlande
RB NL Brands B.V. Schiphol Blwd 207, 1118 BH Schiphol, Niederlande
RB NL Brands B.V. Schiphol Blwd 207, 1118 BH Schiphol, Niederlande
RB NL Brands B.V. Schiphol Blwd 207, 1118 BH Schiphol, Niederlande
Strepfen Orange 8,75 mg, zuigtablett
Strepfen Suns Sucre Orange 8,75 mg, pastilles
Luxemburg
Niederlande
Strepfen Sans Sucre Orange 8,75 mg, pastilles
Niederlande
Strepfen Sinassappel Sulkervij 8,75 mg zuigtabletten
Strepfen Strepsis Orange 2,75 mg, Sugtabletten
Strepfen Drange 8,75 mg, sugtabletter
Strepfen Drange 8,75 mg, sugtabletter
Strepfen brez sladkorja z okusom pomaranče 8,75mg pastille
Strepfen 8,75 mg pastillas para chupar sabor naranja

Hepatitis (Leberentzündung)
 Bei entsprechend sensibilisierten Patienten können durch Levomenthol Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Atemnot) ausgelöst werden. Citral, Citronellol, D-Limorene, Geraniol und Linalool können allergische Reaktionen hervorrufen.
 Meldung von Nebenwirkungen
 Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
 Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels Turbiprofen aufzubewahren?
 Wie ist Dobendan Direkt Zuckefrei Flurbiprofen aufzubewahren?
 Bewahren Sie dieses Arzneimittel näch dem auf dem Umkarton nach "Verwendbar bis" angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Nonats.
 Im Originalkarton aufbewahren.
 Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken), Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umweit bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.defarzneimittelentsorgung.

75 mg pastillas pur.
n 8.75 mg lozenges
Irange Sugar Free 8,75 mg Lozenge
Pherarbeitet im November 2020

3193766